

Måluppfyllelse för kvalitetsindex 2014

Indikator	Antal patienter	Min klinik	Riket	Måluppfyllelse 2010-2013
1 1. Rapporterad till NPCR	45 av 99	45 %	10 %	10 22 31 40 %
2 2. Kontaktsjuksköterska	70 av 87	80 %	50 %	- - - - %
0 3. Väntetid till första besök	50 av 86	58 %	40 %	62 59 72 71 %
0 4. Väntetid till cancerbesked	5 av 99	5 %	10 %	1 1 2 4 %
1 5. Skelettundersökning högriskcancer	20 av 25	80 %	82 %	50 64 81 75 %
2 6. Aktiv monitorering av cancer med mycket låg risk	21 av 22	95 %	75 %	50 64 68 81 %
1 7. Multidisciplinär konferens vid högriskcancer	15 av 30	50 %	45 %	15 25 39 49 %
2 8. Kurativ behandling vid lokaliserad högriskcancer	75 av 87	86 %	71 %	61 74 84 85 %
2 9. Nervsparande intention	23 av 24	96 %	45 %	45 46 59 61 %
0 10. Negativa resektionsränder	36 av 48	75 %	64 %	75 77 69 80 %
11 Summa (värde)				

Definition av indikatorer

- Andel män som rapporterats med diagnostikformulär som rapporterats till NPCR inom 30 dagar efter PAD-besked.
- Andel män med nydiagnosticerad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska.
- Andel män som fått nybesök på specialistklinik pga. misstänkt prostatacancer inom 60 dagar efter att kliniken mottagit remissen.
- Andel män som fått PAD-besked om cancerdiagnos inom 18 dagar efter utförd prostatabiopsi.
- Andel män högst 80 år med högriskcancer som undersökts för skelettmetastaser. Högriskcancer innefattar i) lokaliserad högriskcancer: kliniskt lokalstadium T1,2, i kombination med Gleasonsumma 8-10, och/eller PSA 20-50 ng/ml och ii) lokalt avancerad cancer: kliniskt lokalstadium T3 och PSA under 50 ng/ml.
- Andel män högst 75 år med prostatacancer med mycket låg risk som handläggs med aktiv monitorering. Mycket låg risk: T1c, Gleasonsumma högst 6, PSA högst 10 ng/ml, PSA-densitet högst 0.15 och högst 4 biopsikolvar med cancer med mindre än 8 mm cancer totalt.
- Andel män högst 80 år med högriskcancer utan fjärrmetastaser, som diskuterats på MDK. Högriskcancer indelas i lokaliserad högriskcancer eller lokalt avancerad cancer. Definitionen av multidisciplinärkonferens i NPCR är att urolog och onkolog deltar.
- Andel män högst 75 år med lokaliserad högriskcancer som fått kurativt syftande behandling. Lokaliserad högriskcancer: T1,-T2 i kombination med Gleasonsumma 8-10 och/eller PSA 20-50 ng/ml.
- Andel av män för vilka nervsparande intention (ja eller nej) vid radikal prostatektomi har dokumenterats preoperativt.
- Andel prostatektomipreparat med negativa resektionsränder vid pT2.

Teckenförklaring

Kvalitetsindikatorer i NPCR och tre nivåer av uppfyllelse

Måluppfyllelse på kliniken i relation till gränsvärden

- 2** Hög nivå: över övre gränsvärde
- 1** Mellannivå: mellan nedre gränsvärde och övre gränsvärde
- 0** Låg nivå: nedan nedre gränsvärde

Patienter

Antal patienter för vilka kvalitetsnivån uppnåtts, av totalt antal patienter som hittills rapporterats.

Min klinik/Riket

Andel patienter för vilka kvalitetsnivån uppnåtts. Vertikala strecken visar nedre och övre gränsvärde.

Placering

Klinikens placering i förhållande till andra kliniker som rapporterat indikatorn.

Vill du veta mer? Gå då till www.npcr.se där årsrapporten finns att läsa