

## Måluppfyllelse för kvalitetsindex 2015

Indikator	Antal patienter		Min klinik	Riket	Måluppfyllelse 2011-2014
<b>0</b> 1. Strålbehandling rapporterad till NPCR	40 av 120	33 % 62 %			50 53 40 39 %
<b>0</b> 2. Kontaktsjuksköterska	35 av 101	35 % 65 %			- - 18 20 %
<b>0</b> 3. Multidisciplinär konferens vid högriskcancer	11 av 29	38 % 56 %			18 30 36 42 %
<b>0</b> 4. Väntetid remiss från urolog till behandlingsbeslut hos onkolog för män med högrisk och lokalt avancerad prostatacancer	7 av 30	23 % 38 %			5 5 4 3 %
<b>2</b> 5. Kurativ behandling vid lokaliserad högriskcancer	30 av 31	97 % 86 %			91 92 93 95 %
<b>1</b> 6. Kurativ behandling vid lokalt avancerad högriskcancer	6 av 11	55 % 47 %			60 71 80 75 %
<b>1</b> 7. Adjuvant hormonbehandling av strålbehandlade män med lokaliserad högrisk samt lokalt avancerad cancer	10 av 24	42 % 53 %			15 17 19 22 %
<b>0</b> 8. Väntetid till start av postoperativ strålbehandling	4 av 17	24 % 33 %			20 29 30 31 %
<b>0</b> 9. Användning av magnetresonanstomografi (MR) som stöd vid definition av target	10 av 99	10 % 68 %			30 25 15 10 %
<b>4</b> Summa (värde)					

## Definition av indikatorer

- Andel män som erhållit strålbehandling vars strålbehandlingsformulär rapporterats till NPCR inom 3 månader från start av strålbehandling.
- Andel män som erhållit kurativ primär strålbehandling som har namngiven kontaktsjuksköterska.
- Andel män högst 80 år med högriskcancer utan fjärrmetastaser, som diskuterats på MDK. Högriskcancer indelas i lokaliserad högriskcancer eller lokalt avancerad cancer. Definitionen av multidisciplinär konferens i NPCR är att urolog och onkolog deltar.
- Andel män med färdigutredd högrisk och lokalt avancerad cancer där behandlingsbeslut hos onkolog fattats inom 14 dagar från datum för remiss från urolog.
- Andel män högst 75 år med lokaliserad högriskcancer som fått kurativt syftande behandling. Lokaliserad högriskcancer: T1-T2 i kombination med Gleasonsumma 8-10 och/eller PSA 20-50 ng/ml.
- Andel män högst 80 år med lokalt avancerad prostatacancer (T3, N0/NX, M0 och PSA < 100 ng/ml) som erhållit kurativt syftande strålbehandling alternativt inkluderats i SPCG-15.
- Andel män högst 75 år med lokaliserad högrisk (T1-T2 i kombination med Gleasonsumma 8-10 och/eller PSA 20-50 ng/ml) eller lokalt avancerad prostatacancer (T3, N0/NX, M0 och PSA < 100 ng/ml) som planeras för minst 18 månaders adjuvant hormonbehandling med antiandrogener.
- Andel män aktuella för postoperativ strålbehandling efter radikal prostatektomi som startat planerad strålbehandling inom 30 dagar från utfärdande av strålanmälan.
- Andel män som genomgått primär strålbehandling där MR använts som stöd vid definition av målvolym (prostata).

## Teckenförklaring

## Kvalitetsindikatorer och tre nivåer av uppfyllelse

Måluppfyllelse på kliniken i relation till gränsvärden

- 2** Hög nivå: över övre gränsvärde
- 1** Mellannivå: mellan nedre gränsvärde och övre gränsvärde
- 0** Låg nivå: nedan nedre gränsvärde

## Patienter

Antal patienter för vilka kvalitetsnivån uppnåtts, av totalt antal patienter som hittills rapporterats.

## Min klinik/Riket

Andel patienter för vilka kvalitetsnivån uppnåtts. Vertikala strecken visar nedre och övre gränsvärde.

Vill du veta mer? Gå då till [www.npcr.se](http://www.npcr.se) där årsrapporten finns att läsa