

42011 - Varbergs sjukhus\*

98

diagnostiserade  
inrapporterade

96

behandlingsbeslut

30

primära radikaler

## Måluppfyllelse för kvalitetsindex 2014

Indikatorer	Antal patienter		Min klinik Riket	Måluppfyllelse 2010-2013
<b>0</b> 1. Rapporterad till NPCR	29 av 97	30 % 52 %		
2. Kontaktsjuksköterska	Ej redovisad	- % - %		
<b>1</b> 3. Väntetid till första besök	65 av 74	88 % 72 %		
<b>0</b> 4. Väntetid till cancerbesked	16 av 97	16 % 14 %		
<b>0</b> 5. Skelettundersökning högriskcancer	8 av 14	57 % 74 %		
<b>2</b> 6. Aktiv monitorering av cancer med mycket låg risk	12 av 12	100 % 90 %		
<b>0</b> 7. Multidisciplinär konferens vid högriskcancer	4 av 13	31 % 43 %		
<b>2</b> 8. Kurativ behandling vid lokaliserad högriskcancer	6 av 7	86 % 84 %		
<b>2</b> 9. Nervsparande intention	27 av 30	90 % 87 %		
<b>2</b> 10. Negativa resektionsränder	18 av 19	95 % 84 %		

## Definition av indikatorer

- Andel män som rapporterats med diagnostikformulär som rapporterats till NPCR inom 30 dagar efter PAD-besked.
- Andel män med nydiagnosticerad prostatacancer som har namngiven kontaktsjuksköterska.
- Andel män som fått nybesök på specialistklinik pga. misstänkt prostatacancer inom 60 dagar efter att kliniken mottagit remissen.
- Andel män som fått PAD-besked om cancerdiagnos inom 18 dagar efter utförd prostatabiopsi.
- Andel män högst 80 år med högriskcancer som undersökts för skelettmetastaser. Högriskcancer innefattar i) lokaliserad högriskcancer: kliniskt lokalstadium T1,2, i kombination med Gleasonsumma 8-10, och/eller PSA 20-50 ng/ml och ii) lokalt avancerad cancer: kliniskt lokalstadium T3 och PSA under 50 ng/ml.
- Andel män högst 75 år med prostatacancer med mycket låg risk som handläggs med aktiv monitorering. Mycket låg risk: T1c, Gleasonsumma högst 6, PSA högst 10 ng/ml, PSA-densitet högst 0.15 och högst 4 biopsivolvar med cancer med högst 8 mm cancer totalt.
- Andel män högst 80 år med högriskcancer utan fjärrmetastaser, som diskuteras på MDK. Högriskcancer indelas i lokaliserad högriskcancer eller lokalt avancerad cancer. Definitionen av multidisciplinärkonferens i NPCR är att urolog och onkolog deltar.
- Andel män högst 75 år med lokaliserad högriskcancer som fått kurativt syftande behandling. Lokaliserad högriskcancer: T1,-T2 i kombination med Gleasonsumma 8-10 och/eller PSA 20-50 ng/ml.
- Andel av män för vilka nervsparande intention (ja eller nej) vid radikal prostatektomi har dokumenterats preoperativt.
- Andel prostatektomipreparat med negativa resektionsränder vid pT2.

## Teckenförklaring

## Kvalitetsindikatorer i NPCR och tre nivåer av uppfyllelse

Måluppfyllelse på kliniken i relation till gränsvärden

- 2** Hög nivå: över övre gränsvärde
- 1** Mellannivå: mellan nedre gränsvärde och övre gränsvärde
- 0** Låg nivå: nedan nedre gränsvärde

## Antal patienter

Antal patienter för vilka kvalitetsnivån uppnåtts, av totalt antal patienter som hittills rapporterats.

## Min klinik/Riket

Andel patienter för vilka kvalitetsnivån uppnåtts. Vertikala strecken visar nedre och övre gränsvärde.

Vill du veta mer? Gå då till [www.npcr.se](http://www.npcr.se) där årsrapporten finns att läsa